


18 Xbre 1776

cat. B. n° 237.



Mémoire

Sur


Différentes observations Chirurgicales.

Par Joseph Dubrana maître en Chirurgie
à Condom.



ARC 20 d 8.

3924811



MÉMOIRE

Sur

Differentes observations chirurgicales.

Lentâ tandem arte mitigatur Dolor.

La Chirurgie à toujours regardée Comme redoutables les inflammations internes qui se terminent par suppuration, sur-tout — Lors que des viscères très-considérables en sont les tristes victimes; tant par rapport à la lésion ou entière abolition des fonctions de l'organe, qu'à cause de l'épanchement du pus, dans la cavité ou l'organe est contenue.

Cependant il ya des cas où cette terminaison peut devenir avantageuse, parce que, dans quelques circonstances, l'art peut procurer une issue au pus qui forme l'abcès; & en même tems favoriser l'extraction des Corps étrangers qui peuvent s'y rencontrer.

1. observation.

Dans Le mois de Septembre 1775. je fus appelé pour voir un homme âgé d'environ quarante ans, qui depuis cinq semaines, avait une tumeur à la région lombaire droite accompagnée de fièvre, de diarrhée, & de vomissement; des douleurs, qui s'étendaient dans toute



La partie dorsale, avaient précédé la tumeur; la peau n'avait presque point changé de couleur. j'aperçus, par le tact, une fluctuation quoique profonde: je mis un Cataplasme Emmollient sur la tumeur, je prescrivis un régime humectant & adoucissant avec L'eau d'orge & la Crème de riz.

Le lendemain la tumeur était un peu plus saillante; - j'appliquai un Cataplasme maturatif, dont je fis usage pendant trois jours: la fluctuation de la matière me paraissant assez - sensible, je me déterminai à faire l'ouverture de l'abcès, duquel sortit une quantité considérable de pus, avec trois ou quatre petits fragmens de pierres, dont je ne m'aperçus qu'après avoir appliqué l'appareil, en faisant l'examen du pus; (Circonstance que je n'omais jamais après l'ouverture des abcès.) je pansai la plaie, & j'ordonnai une diète exacte, consistant en deux onces de bouillon de quatre en quatre heures, & L'eau d'orge pour toute boisson.

Le lendemain je levai l'appareil; & en conséquence des matières pierreuses, que j'avais observé le jour de l'opération, je fis un examen scrupuleux de la cavité de l'abcès: une sonde introduite me fit reconnaître un corps dur, que le bout de mon doigt vérifia: ayant voulu tenter tout de -

Suite L'extraction du Corps Étranger, j'y trouvai une résistance que je ne voulus pas violenter Crainte d'attiser l'inflammation, toujours inséparable du déchirement: je portai donc une sonde crénellée dans la plaie, & à la faveur de la crénellure je portai la pointe d'un bistouri, proche le Corps dur, avec lequel je fis quelques petites incisions pour élargir le passage & faciliter l'extraction, que je fis tout de suite avec des pincettes: je tirai d'abord une pierre de figure ovale, de la grosseur d'une noisette; je portai encore les pincettes dans cette cavité, & ayant rencontré une autre dureté, je la chargeai & la tirai de même; cette dernière pierre était de même figure, mais moins grosse de la moitié que la première.

pour m'assurer s'il n'y en aurait pas encore quelqu'autre, j'examinai de nouveau avec les pincettes, avec la sonde et avec mon doigt, n'en ayant point remarqué d'autre je pansai la plaie avec le digestif simple: je soignai le malade deux heures après, & recommandai d'observer le régime que j'avais prescrit la veille.

La suppuration fut abondante jusqu'au huitième jour; elle diminua à mesure que l'affaiblissement des vaisseaux se



fit, & enfin la plaie fut parfaitement Consolidée le vingt-quatrième jour de L'opération.

La régularité du régime que j'ordonnai au malade, qui fait le sujet de cette observation, m'a paru être la première & la principale cause de sa prompte guérison; Car L'amaigrissement produit par une telle Diète, gardée jusqu'au quinsième jour, doit nécessairement être une cause réelle de L'affaiblissement des Solides, qui joint à L'Expiration du tissu Cellulaire que procure la Suppuration, comme L'ont sagement observé m. fabre & m. Louis, doit nécessairement opérer la Consolidation.

II. observation.

un homme d'environ trente ans, avait un crachement de sang, à la suite d'une fluxion de poitrine, il y a environ trois ans. Cette hémoptysie était accompagnée d'une toux fréquente & d'un peu de fièvre: Les remèdes les mieux indiqués furent mis en usage sans de moindre succès. j'appris du malade que — Lorsqu'il toussait il lui semblait appercevoir une petite tumeur à la partie inférieure, latérale droite de la poitrine; j'examinai ce signe attentivement, & je fus témoin que chaque fois qu'il toussait, ou qu'il retenait fortement sa respiration, il se formait

une tumeur de la grosseur d'environ un œuf de pigeon, entre les cartilages de la dernière des vraies côtes & de la première des fausses. j'eus quelque soupçon d'une hernie de l'estomac; mais, après avoir fait attention à la situation de ce viscère, & à la fluctuation de la tumeur, je n'eus pas de peine à conclure que c'était un véritable abcès duquel je me déterminai de faire l'ouverture.

voici la conduite que je suivis pour ouvrir cet abcès. je fis pencher le malade sur le côté gauche, & lui ayant ordonné de retenir son haleine la tumeur se montra comme elle avait accoutumé de faire, tout de suite je plongeai un trois-quart, avec circonspection, jusqu'à la matière, je retirai le poinçon & il sortit par la canule environ un grand verre de pus après l'ouable. je laissai la canule en place, & l'assujettis au tour du corps avec un ruban; elle me servit à faire des injections avec l'eau d'orge & le miel rosat, une fois le jour, pendant huit jours. pour lors je retirai la canule, je mis un petit emplâtre sur la plaie, une compresse, le tout soutenu par la serviette & le scapulaire, comme j'avais fait en premier lieu après la sortie du pus.

Le malade fut parfaitement guéri dans l'espace de douze jours. je le saigné le jour de l'opération, & lui fis



observer pendant toute la cure une Diète Exacte, qui —
consistait En cinq grises de bouillon toutes les vingt-
quatre heures, & L'eau D'orge pour toute boisson, pendant
les quatre premiers jours : Le Cinquième je joignis au
bouillon, pendant la journée, deux Cuëllles de Crème —
de riz : Le huitième jour je lui fis donner un peu de
Soupe & quatre Cuëlllerées de vin pendant tout le jour :
il Continua ainsi jusqu'à L'onzième, & Ensuite il reprit
peu-à-peu sa maniere de vivre ordinaire.

je Crois fort que la régularité du régime est la —
principale Cause de cette prompte & heureuse guérison,
Le malade ayant été exempt de fièvre pendant tout le
traitement. je ne fais point ici mention de la Situation
que je donnais au malade pour les pansements, c'est-à-
dire, de le faire Coucher sur L'ouverture après les in-
jections.

III. observation.

une fille D'Environ 17 ans tenant une grosse aiguille —
à sa bouche, L'avala En dormant. Elle s'arresta à L'oso-
phage de façon que la piqueuse dissipra le Sommeil,

et fit bientôt appercevoir la fille de ce qui venait de
se passer contre sa volonté. on essaya de retirer le corps
étranger ou de le faire descendre dans l'estomac, mais tout
fut inutile; Enfin je fus requis, je trouvai la malade —
dans un mouvement convulsif de la mâchoire à ne pou-
voir pas absolument ouvrir la bouche, & un hoquet continu.

Le danger ou me parut la malade & l'impossibilité
ou je me voyais de tenter quelque moyen d'extraction —
par la bouche, me fit prendre la résolution de faire —
une ouverture à la partie latérale gauche de l'œsophage,
vis-à-vis l'endroit où la malade faisait signe qu'étoit le
corps étranger. voici la façon dont je me comportai dans
cette opération.

je fis une incision longitudinale, d'environ un pouce
& demi, à la partie moyenne du cou, au côté gauche de
la trachée-artère, en faisant tenir la peau pincée d'un côté
& la tenant moi-même de l'autre, comme on le pratique
pour l'opération du bubonocèle avec étranglement. j'agis —
ensuite avec prudence pour mettre l'œsophage à découvert
sans ouvrir de vaisseau considérable; cela exécuté je sentis



La pointe de L'équille avec mon doigt, je plongeai la
pointe d'un bistouri à côté du corps étranger, & j'allongeai
l'incision en haut, en retirant l'instrument; ensuite,
avec les bouts de quincettes, que j'introduisis dans L'oso-
phage, je saisis fortement L'équille & par de petits
mouvements je la degageai & la tirai dehors. je mis sur
les lèvres de la plaie, que je rapprochai, une compresse
imbue d'huile d'olive & de vin chaud, une autre compresse
sèche par dessus, le tout retenu par le bandage unissant.

je saignai tout de suite la malade; je lui
fis observer un régime exact, lui donnant seulement
de quatre en quatre heures un œuf frais le premier jour:
le second on lui donnait trois onces de gelée dans les
mêmes intervalles; & dans la suite, pendant huit jours,
on lui donna de trois en trois heures une grise ordinaire
de bouillon. je ne levai l'appareil que le quatrième
jour & la plaie était presque consolidée. je remis ce-
pendant une compresse avec du vin chaud & le bandage
jusqu'au douzième jour, tems auquel la malade commençait
à manger un peu de soupe, sans aucune incommodité.

IV. observation.

Vers la fin de l'année 1774. je fus requis pour assister à l'ouverture du Cadavre d'une fille de treize ans, morte dans l'hôpital général de la ville de Condom, à la suite d'une maladie qui avait pour symptômes une oppression de poitrine, palpitation du cœur, avec douleur dans cette région; Syncopes fréquentes, Influxus adematense. des Extrémités, avec un pouls inégal, petit & intermittent.

La poitrine ne fut pas plutôt ouverte que nous fumes instruits sur la vraie cause de la mort, à l'aspect d'un péricarde extrêmement gonflé par une quantité considérable de sérosité: cette hydrocardie était pour ainsi dire collée contre la troisième, quatrième, cinquième, & sixième côte, région où la malade ressentait la douleur & la pesanteur.

Les M^{rs} Laborde, & Ladous, chirurgiens de quartier, mes confrères, délibérèrent que la maladie était incurable: j'osai cependant avancer qu'elle aurait pu guérir au moyen d'une ponction avec le trois-quarts, faite entre la quatrième & la cinquième côte, dans l'endroit où se

faisait sentir la pesanteur & la douleur, de la manière qu'on la pratiquait pour la varicelle ventrale: je fus seul de mon avis, mais néanmoins déterminé à l'opérer si jamais l'occasion se présentait. Enfin elle arriva, en voici le détail.

au mois de Septembre 1775. je fus mandé pour donner mon secours à une fille, d'environ 17 ans, dans un hameau, à une lieue de Condom. La malade était travaillée, depuis environ un mois & demi, d'un Rhume opiniâtre qu'elle avait négligé; des Enflures adémateuses, aux pieds, & aux mains, avaient paru presque aussitôt que le Rhume; La Dyspnée s'était mise de la partie il y avait trois semaines, de même que la palpitation du Cœur; Son pouls était petit & intermittent; elle avait depuis neuf jours de fréquentes Syncopes. La difficulté de respirer & la palpitation du cœur étaient moindres, lorsque la malade était couchée horizontalement & la tête élevée; mais tous ses Symptômes redoublaient lorsqu'elle voulait se coucher sur un des côtés.

La considération de tous ces Symptômes me rappelésent bien-tôt ceux que j'avais observé, dans la malade qui fit le Sujet de l'ouverture du Cadavre, dont je viens de faire le narré. Encouragé d'ailleurs par une observation de m. morand sur une hydropisie de poitrine, pour laquelle m. moreau & m. Louis, furent appelés en Consultation, & dont la ponction fut suivie du plus heureux succès (a). il est vrai que les Symptômes de celle que j'avais en main, comparés avec ceux, de celle de l'ouverture du Cadavre, m'assuraient une hydropisie du péricarde, au-lieu que celle de m. morand étoit de la Cavité gauche de la poitrine; je ne m'arrêtai point à cette différence, & je crus que la ponction faite au péricarde, pouvait avoir le même succès que celle qui avait été faite à la poitrine, c'est pourquoi je me mis en devoir de la faire sur le champ.

Je fis assis la malade dans son lit, le Corps penché en-dévant, un homme placé pour la soutenir dans cette posture; je plongeai un trois-quarts ordinaire entre la

(a) mem. de L'acad. roy. de chirus. tom. 2.

quatrième & la cinquième des vraies côtes, dans
l'endroit où la douleur se faisait le plus sentir.
je n'en pus pas plutôt retirer le poinçon que l'eau
sortit par la canule à plein jet & par bonds,
occasionnés par le mouvement du cœur & de la
respiration; j'en retirai un peu plus d'une pinte,
couleur de graille, & sans mauvaise odeur.

à mesure que l'eau sortait le soulagement
augmentait pour la malade, par la diminution
de la dyspnée & de la palpitation du cœur, de sorte
que représentant un bien-être, qu'elle n'avait pas
éprouvé depuis bien de jours, elle se crut guérie
sans autre remède.

L'eau ayant cessé de sortir, je retirai la canule:
la malade se coucha tout de suite à son aise, elle
prit deux aufs frais, & s'en dormit; à son reveil on lui
fit avaler une prise ordinaire de gélée: le lendemain
je trouvai son poulx ranimé, & la malade fort contente

D'avoir si bien grassé la nuit. je lui prescrivis —
un régime exact avec la crème de riz, trois prises
ordinaires par jour, pour toute nourriture pendant
huit jours; ne lui accordant point toute la boisson
qu'elle aurait désirée; mais seulement quelque
verrée d'eau d'orge lors que la soif la pressait —
Extrêmement. Ensuite je lui fis manger quelques
Cueillerées de soupe une fois le jour, le matin; &
le soir un peu de rôti: de deux jours l'un je
lui faisais prendre deux onces de Syrop de neppun,
& tous les jours d'intervalle entre les prises du Syrop,
je lui faisais avaler une dragme de vinaigre —
Scillitique. Ce régime fut continué pendant —
Environ un mois, après lequel je prescrivis le lait
pour toute nourriture, pendant quinze jours; elle
en prenait une prise le matin; de la soupe de
lait pour dîner & pour souper, sans mélange
d'aucune autre nourriture.

grâces au ciel mes desirs ont été satisfaits, & la malade jouit d'une bonne santé. La médecine vulnérable a fait voir sa quippance dans cette opération, qui peut être comptée, & mise au nombre de ses beaux momens, puisqu'elle a arraché la malade à une mort qui était inévitable. on conviendra de même que la malade a été préservée du retour de cette hydrocardie par le régime fraticqués.

De quel front taxerait-on encore, de trop — entreprennant un chirurgien humain, ami de la santé, qui voyant un malade prêt à devenir la proie de la mort, cherche à l'en délivrer par quelque moyen, quoique douteux: La mort n'était elle pas certaine dans le cas présent, si d'eau — du péricarde n'avait pas été évacuée? L'opération quoiqu'incertaine, ne pouvait elle pas l'arracher

au péril ? qu'ai-je donc fait, & que fait-on dans
des pareilles circonstances, sinon qu'exécuter le
sage précepte de Celse, au chapitre dixième du
deuxième Livre, qui dit ;

» il vaut bien mieux tenter un remède incertain,
» que ne vouloir prêter au patient la main.

Nous conviendrons, avec m. morand, que cette opé-
ration n'est point dangereuse, que pratiquée à
propos, comme plusieurs autres, elle ne peut
tourner qu'à l'honneur & à la gloire de la chirur-
gie, qu'il est essentiel de publier le succès des
opérations rares pour encourager à les faire, &
qu'enfin le grand mal c'est qu'on les pratique
trop rarement & trop tard.

V. observation.

Le Lundi, 6 mai 1776, un enfant de neuf ans, —
d'un hameau de la paroisse de Roquepine, jouant
avec une petite boule de marbre, de la grosseur
à peu-près d'une balle de pistolet: il la jetait en
l'air pour s'exercer à l'attrapper avec sa bouche;
Enfin il l'attrappa si bien une fois, qu'elle lui
tomba directement dans le gosier, & enfila de
conduit de la trachée-artère: il crut avoir —
avalé la boule; mais la difficulté de respirer
& la toux convulsive dont-il fut assailli presque
dans l'instant, donnèrent de l'alarme aux parents,
& les déterminèrent à chercher promptement du
secours. on savait que j'étais arrivé la veille, chez
un de mes parents, qui n'est pas éloigné de l'endroit,
& on vint me prier de m'y transporter. En attendant
on avait fait prendre quelques cuillerées d'huile,

Dans la pensée qu'ils avaient que le corps étranger
fut dans l'œsophage. à mon arrivée étant informé
de la nature & de la figure dudit corps, &
de la façon dont l'Enfant l'avait reçu, je ne
pûs me persuader qu'un corps lisse, poli, rond,
& d'un volume médiocre, eût pu s'arrêter dans
l'œsophage. Les signes que l'Enfant faisait pour
répondre aux questions que je lui faisais sur
l'endroit où il sentait l'embarras, qui gênait si
fort sa respiration, m'indiquait toujours, que, la
trachée-artère contenait le corps étranger: la
liberté de la déglutition était d'ailleurs une preuve
que le conduit des alimens n'était point intéressé.
Les symptômes étaient violens & demandaient un
prompt secours; ce qui fit que je me déterminai
bien vite à faire part de mon sentiment: qui
était de faire une incision à la trachée-artère —



pour en extraire le Corps étranger. tous ceux qui -
étaient dans la chambre du malade furent interdits,
en entendant parler de fendre le Côté; mais je
les rassurai en peu de mots; je leur fis voir le
danger du retardement, & la simplicité de l'opéra-
tion: la grande confiance qu'on avait en moi
dans ce Canton, fit que je les persuadai assés-
aisément: je me disposai donc à opérer.

Le malade couché dans son lit, sur le dos,
je lui fis mettre quelques hardes sous les épaules,
afin que cette partie fut un peu plus élevée
que la tête, & que, par ce moyen, la partie
antérieure du Côté se présentât mieux: je
plaçai une personne sur le lit pour affermir
la tête, & une autre au pied du lit, pour ap-
puyer les mains & les parties inférieures de l'enfant.

Ensuite, avec un bistouri, je fis une incision longitudinale à la partie antérieure & moyenne du cœ, d'environ un pouce & demi de long, jusqu'à la trachée-artère; je pompai le sang avec un peu de linge; j'incisai, longitudinalement, quatre anneaux de ce conduit cartilagineux; la boucle se présenta dans le même instant à l'ouverture, & je la tirai avec des pincettes à pansement.



Cela fait, je nettoyai la plaie, j'appliquai un emplâtre agglutinatif, qui tenait depuis une partie latérale du cœ jusqu'à l'autre, observant de faire tenir rapprochées les lèvres de la plaie par un serviteur; ensuite je mis une compresse, & je soutins le tout par le bandage unissant.

Le malade parût guéri dans l'instant, par la dissipation de tous les symptômes: Cependant je lui fis une saignée une heure après, pour prévenir l'inflammation, & je fis observer une diète

avec le bouillon & l'eau d'orge pour toute nourriture, pendant deux jours; après lesquels il mangea un peu de soupe.

Je ne levai l'appareil que le quatrième jour, la réunion était parfaite, excepté la peau; j'appliquai une compresse trempée dans le vin & l'huile chaude, & je remis le même bandage. Je laissai le malade, en avertissant les gens de laisser cela en place encore deux jours, & de l'ôter ensuite tout-à-fait. Enfin la consolidation, & la guérison, ont été entières, dans l'espace de six jours.

La célèbre Société académique me permettra de faire remarquer, que je préférerais la situation horizontale du malade, à celle de le faire assis sur une chaise, dans la crainte que j'aurais de déplacer le corps étranger; vu que j'étais certain par l'indication, que le malade m'en donnait avec sa main, de le rencontrer sous l'incision, comme cela arriva. on pourrait peut-être m'objecter que la situation que j'ai choisie aurait pu donner lieu au sang, qui sortait

de l'incision, de tomber dans la trachée-artère, lorsque je coupai les cartilages; mais je prévins cet accident, en me servant d'un morceau de linge fenêtré, que je tenais sur les lèvres de la plaie, avec le pouce & l'index de la main gauche, pour absorber le sang, pendant que j'incisai les anneaux cartilagineux: j'observai encore, que le sang qui sortit fut de si peu de conséquence, qu'il n'équivalait pas demi-once.



